




Dr. Böhm® TraubensilberKerze 6,5 mg Filmtabletten

- **Zusammensetzung pro Filmtablette:**
1 Filmtablette enthält 6,5 mg Trockenextrakt aus Cimicifuga-Wurzelstock (Traubensilberkerze).
- **Anwendungsgebiete:**
Pflanzliches Arzneimittel bei Wechselbeschwerden (Klimakterisches Syndrom) in Form von Hitzewallungen, Schweißausbrüchen, Schlafstörungen, Verstimmungszuständen wie Unlustgefühl, Reizbarkeit und nervöser Unruhe.
- **Dosierung:**
Täglich 1 Filmtablette unzerkaut mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
- **Dauer der Anwendung:**
Da sich die Behandlungsergebnisse mit Fortdauer der Anwendung verbessern, wird die Einnahme von Dr. Böhm® TraubensilberKerze 6,5 mg Filmtabletten über einen längeren Zeitraum empfohlen.
- **Packungsgröße:**
60 Filmtabletten



Dr. Böhm®

QUALITÄT AUS IHRER APOTHEKE



Dr. Böhm® TraubensilberKerze 6,5 mg Filmtabletten


Das pflanzliche Arzneimittel bei:

- ✓ Wechselbeschwerden
- ✓ Hitzewallungen
- ✓ Schweißausbrüchen

Sehr gut verträglich!



Dr. Böhm® GEPRÜFTE QUALITÄT AUS DER APOTHEKE



Mag. pharm. Dr. med. Friedrich Böhm (Mediziner, Pharmazeut und Gründer der Firma Apomedica):
„Wir fühlen uns dem Menschen verpflichtet. Deshalb entwickeln wir mit Freude und Begeisterung Produkte, die dem Menschen von heute einen besonderen Vorteil für die Gesundheit von morgen bringen.“

Dr. Böhm® Produkte stehen für beste Qualität und beruhen auf 3 Säulen:

- Innovative Rezepturen, basierend auf traditionellen Erkenntnissen und aktuellen Forschungsergebnissen aus Medizin und Pharmazie
- Ausschließliche Verwendung hochwertiger und geprüfter Rohstoffe
- Herstellung nach internationalen pharmazeutischen Qualitätskriterien

Weil ein qualitativ hochwertiges Produkt auch kompetente Beratung erfordert, ist das Dr. Böhm® Sortiment ausschließlich in der Apotheke erhältlich.

OHNE HITZEWALLUNGEN DURCH DIE WECHSELJAHRE


Nur 1 Tablette täglich



Informieren Sie sich in Ihrer Apotheke oder auf www.apomedica.com

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

4148/2 (AT)



HARMONIE AUS DER APOTHEKE

- bei Hitzewallungen
- bei Schweißausbrüchen
- speziell für Frauen ab 50
- spürbare Besserung bereits nach 2-4 Wochen
- sehr gut verträglich
- rein pflanzliches Arzneimittel
- optimal dosiert mit 6,5 mg gemäß ESCOP (Europäischer Gesellschaft für Pflanzenheilkunde)
- nur 1 Tablette täglich

ZEIT DER VERÄNDERUNG

Das Klimakterium ist eine natürliche Phase im Leben jeder Frau. Und jede nimmt diese Zeit der Veränderung anders wahr – auch in Art und Stärke der Beschwerden.

Das wohl häufigste Symptom der Wechseljahre sind allerdings die Hitzewallungen.

Diese treten bei jeder Frau unterschiedlich in Erscheinung. Mal begleitet von Herzklopfen, mal von Schweißausbrüchen, mal von Schwindelgefühlen. Gemeinsam ist den Wallungen jedoch, dass diese in der Regel völlig überraschend auftreten.

Traditionsreiche Traubensilberkerze

Ihren weißen, traubig angeordneten Blüten hat die Traubensilberkerze den Namen zu verdanken. Cimicifuga racemosa, wie der lateinische Name der weiß blühenden, aus Nordamerika stammenden Arzneipflanze lautet, wird bereits **seit über 100 Jahren bei gynäkologischen Beschwerden eingesetzt**. Inzwischen ist die Traubensilberkerze aus der modernen Frauenmedizin nicht mehr wegzudenken.

WECHSELJAHRE IM GLEICHGEWICHT

Dr. Böhm® Traubensilberkerze 6,5 mg Filmtabletten beruhen auf einem regulierenden Effekt im Zentralnervensystem ohne selbst Hormone zu sein. Die Dosierung von 6,5 mg pro Tablette entspricht internationalen pflanzenheilkundlichen Empfehlungen. **Daher reicht die Zufuhr von nur einer Tablette Dr. Böhm® Traubensilberkerze täglich.** Je früher die Einnahme nach Auftreten der ersten Beschwerden begonnen wird, umso größer der Effekt. **Morgens genommen, werden Hitzewallungen und Unlustgefühle günstig beeinflusst, abends eingenommen, erzielt man einen guten Effekt bei Nachtschweiß.**

Wie bei vielen pflanzlichen Arzneimitteln baut sich die Wirkung schrittweise und schonend über mehrere Wochen auf. **Eine spürbare Linderung ist meist nach zwei bis vier Wochen zu bemerken.** Um bestmögliche Behandlungsergebnisse zu erzielen, sollte die Therapie jedoch kontinuierlich über einen längeren Zeitraum erfolgen. Dennoch sollten Sie in mehrmonatigen Behandlungsintervallen Rücksprache mit Ihrem Frauenarzt halten und auch die regelmäßige Vorsorgeuntersuchung in Anspruch nehmen.